

396. *Astragalus stenocystis* Bge.

in Astrag. turk., n° 165 in Изв. О-ва Любит. Естеств Антроп. и Этногр. XXVI. 2, стр. 301—1880.

§ *Stenocystis*.

Cette espèce est décrite d'après les échantillons d'O. Fedtschenko de Dshizman (mont. Nura-tau). Nous avons des échantillons de ces mêmes montagnes, tout à fait identiques à ceux que nous éditons ici.

Cette espèce est aussi voisine de l'A. Turczaninovii K. et K. (*Cercidothrix* § *Tamias*) que de l'A. *cyrtobasis* Bge. (*Calycozystis* § *Cyrtobasis*): elle est encore plus voisine, à mon point de vue, de l'A. *arganaticus* Bge. (*Cercidothrix* § *Erioceras*) qui a aussi la grappe capitulée raccourcie.

Sur les calices de l'A. *stenocystis* il y a plus de poils noirs que sur l'A. *cyrtobasis*. Le nombre de paires des folioles est ordinairement de 4; sur l'A. *cyrtobasis* il y en a davantage 5—7. La grappe est plus étroite et plus lâche, le calice est rompu par le légume. Ce dernier a 10—15 mm. de longueur, du côté ventral il est caréné et cannelé du côté dorsal, blanc-lanugineux, biloculaire.

En général, la différence est tout à fait suffisante pour distinguer l'A. *stenocystis* de l'A. *cyrtobasis*, d'autant plus que leurs aires non-seulement ne coïncident pas, mais sont même séparées: l'A. *stenocystis* ne nous est pas connu plus à l'Est que Samarkand et Urgut, et l'A. *cyrtobasis* n'atteint à l'Ouest que les monts Mogol-tau. Nous ne savons pas s'il se rencontre une espèce quelconque de ce cycle dans l'intervalle entre Mogol-tau et Samarkand, c'est à dire le long du versant septentrional des monts de Turkestan.

M. Попов.

Montes meridionales: Sogdiano-transoxanae. Ad declivia argillosa-saxosa montium Samarcandicorum in pago Kara-tepe.

1928. VI. 4 fl. et fr.

Leg. Popov et Rajkova.

397. *Astragalus taschkenticus* Bge.

Astrag. turk., n° 126 in Изв. О-ва Люб. Ест., Астр. и Этногр. XXVI. 2, p. 280—1880.—Lipsky in AHP. XXVI, p. 266.

§ *Proselius*.

Cette espèce est parfaitement décrite par Bunge et Lipsky. Outre d'autres caractères elle se distingue facilement par ses corolles d'un rouge foncé (couleur „Bordeaux“).

L'unique malentendu qui a eu lieu par rapport à cette espèce concerne la question, où se trouve son lieu classique. Bunge lui-même a indiqué: „près de Taschkent, dans la région d'Andergij“ et dans la vallée du Zeravshan. B. Fedtschenko (AHP. XXIV, p. 226) dit: „en réalité cet exemplaire a été cueilli par Kuszakewicz (!) dans la région d'Andersaj du district de Chodshent“, c'est à dire très loin (pas moins de 150 kilomètres) de Taschkent. Lipsky (l. c.), enfin cite: „Andergin près Taschkent, 17 mai (Severtzov! non Kuszakevicz)“.

L'habitat de cette espèce près de Taschkent est inconnu aux botanistes de Taschkent; ce qui rend douteux qu'un des authentiques de cette espèce y ait été cueilli, de sorte que cette espèce porte en vain le nom de „taschkenticus“.