

70. Rapistrum

- b.** subsp. **integrifolia** (Hornem.) Greuter & Burdet in [integrifolia]
Greuter, Burdet & G. Long, Med-Checklist 3: 74 (1986)

C. maritima var. *integrifolia* Hornem., Fors. Oecon. Plantel. ed. 3, 1: 709 (1821) [basión.]

C. monosperma Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 5, tab. 7 (1864)

C. maritima subsp. *maritima* auct.

Ind. loc.: “Ikke sjelden her ved Strandkanterne, hvor Jorden er sandet; ogsaa i Nordlandene, Færøerne og Island. Afarten har jeg fundet ved Stranden imellem Ribe og Kiergaard” [No rara aquí en las costas con suelo arenoso; también en los países del norte, las islas Feroë e Islandia. He encontrado la especie en la costa entre Ribe y Kiergaard; (SW de la península de Jutlandia)]
lc.: Lám. 158 h-k

Artejo inferior del fruto en muchos casos abortado y reducido; con el ápice generalmente plano o convexo; proyecciones de 0-1 mm, de patentes a reflejas. $2n = 18$.

Arenales marítimos nitrificados y ambientes ruderales subsalinos; 0-20 m. I-XII. Costas atlánticas entre Lisboa y Noruega. N y NW de la Península Ibérica **Esp.**: Bi C Lu O Po SSS. **Port.**: BL DL E Mi.

70. Rapistrum Crantz [nom. cons.]*

[Rapistrum n. – lat. *rapistrum*, -i n. = una clase de nabo salvaje, quizá el rabanillo –*Raphanus Raphanistrum* subsp. *Landra* (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens]

Hierbas anuales o perennes, con pelos simples. Tallos erectos, muy ramificados. Hojas de enteras a pinnatífidas: Flores en racimos ebracteados, alargados en la fructificación. Sépalos erecto-patentes, los laterales gibosos en la base. Pétalos unguiculados, amarillos. Androceo tetradínamo. Nectarios medianos cónicos, los laterales pequeños, prismáticos. Frutos en silícula, con dos artejos bien diferenciados; artejo inferior cilíndrico, persistente durante un tiempo sobre la planta, a veces tardíamente dehiscente, con 0-4 semillas; el superior (rostro), nuciforme, globoso, indehiscente pero tempranamente caedizo, con 1(2) semillas, prolongado en el estilo. Semillas oblongas, comprimidas; cotiledones conduplicados.

Bibliografía.—O.E. SCHULZ in A. ENGLER, Pflanzenr. 70: 252-261 (1919); J. BARANDA in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 278 (1983).

- 1. R. rugosum** (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785) [rugósum]

Myagrum rugosum L., Sp. Pl.: 640 (1753) [basión.]

Ind. loc.: “Habitat in Europa australi”

lc.: Lám. 159 a-h

Planta anual, de hasta 150 cm de altura. Hojas basales 3-25 × 1-11 cm, arrosetadas, de enteras a lirado-pinnatífidas, con lóbulos dentados, obtusas, cuneadas en la base, con pelos simples, rígidos, unicelulares; las caulinares, progresivamente menos divididas. Pedicelos 2-4(6) × (0,5)1-1,5 mm en la fructificación. Flores numerosas, hasta 600. Sépalos 3-4 mm, glabros o algo pelosos.

* P. Catalán